

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

**BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON**

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

. MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

6ème année n° 29

1ère - 2ème - 3ème Editions n° 10

4ème Edition n° 9

5ème Edition n° 5

11 mai 1958

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POIRES ET POMMES

Toutes zones

Les éclosions se poursuivent tandis qu'à été détruite la protection réalisée à la suite des précédents avis; nous recommandons de réaliser un nouveau traitement qui sera réalisé :

avant le 18 juillet	zones 1,2,4
avant le 20 juillet	zones 3
avant le 25 juillet	zones 5 et 6

Etant donné les conditions météorologiques actuelles qui sont favorables aux maladies nous conseillons d'ajouter au traitement insecticide un produit fongicide qui préservera les fruits et les pousses de la tavelure.

TORDEUSE ORIENTALE

Zones 1, 2, 4

Commencer les traitements destinés à préserver les fruits devant être récoltés entre le 5 et le 15 août.

INFORMATIONS

PUCERONS - PSYLLES

Toutes zones

On observe un renouveau d'activité de ces parasites. S'il convient de traiter avec circonspection les arbres dont les fruits arrivent à maturité, par contre on ne doit pas hésiter à réaliser un traitement énergique des arbres débarrassés de leur récolte afin de leur assurer une bonne végétation estivale.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Zones 1,2,3,4

Il convient de réaliser un nouveau traitement qui assurera la production de tubercules sains.

MALADIES DE LA TOMATE

Toutes zones

Faire une pulvérisation à l'aide de bouillies anticryptogamiques.

MOUCHE DES FRUITS

Zones 1,2,3,4

Les premiers dégâts ont été observés dans divers vergers. Il convient :

- 1°) de ramasser et d'incinérer les fruits véreux
- 2°) d'effectuer à plus de 15 jours de la cueillette, des traitements avec un insecticide du type :

DIPTEREX -- D.D.T. -- MALATHION -- PARATHION

En raison de la brève efficacité de ces insecticides, sur le pêcher, il peut être nécessaire d'effectuer un deuxième traitement à quelques jours d'intervalle (3 à 5 jours). Les traitements doivent être soignés. Traiter également les brise-vents et les haies à proximité des vergers.

L'Inspecteur du Service de la
Protection des Végétaux,
P/BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
L.L.TROUILLON

7243

Ministère de l'Agriculture

Ecole Nationale d'Agriculture de
MONTPELLIER

Montpellier le II Juillet 1958

STATION REGIONALE
D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

NOTE n° 8

MILDIU. Les orages du 24 au 26 juin et ceux très violents -parfois accompagnés de grêle- des 8 et 9 juillet ont particulièrement intéressé la majeure partie des vignobles de l'Hérault et du Gard.

Ils ont dû provoquer sur les souches peu protégées, une extension de la maladie à partir de germes existants.

Afin de prévenir les manifestations possibles de rot-brun et les attaques tardives du feuillage, il conviendrait d'effectuer dès maintenant un traitement soigné qui pourrait être renouvelé si la végétation n'est pas sur le point de s'arrêter.

EUDEMIS. Le vol s'est poursuivi à Latour de France (Pyr.Or.) , Cruscades (Aude), Vendémian, Valros (Hérault).

Les pluies ayant lavé le dernier poudrage, il y a intérêt à procéder à une répétition de l'opération.

COCHYLIS. Les captures de papillons ont été importantes à Pont-St-Esprit, notables à Massillargues-Attuech ; le traitement à base d'esters phosphoriques, qui s'y rapporte est à effectuer dès l'apparition des premiers dégâts.

GRELE. Dans les cas où la végétation est très abîmée, on peut retailler sur le milieu du courson de l'année dernière et supprimer sur l'empâtement le rameau inférieur blessé.

Les résultats sont aléatoires, l'aoûtement des nouvelles pousses étant subordonné à la durée d'un bel automne.

Bien défendre contre le mildiou.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles :

G.BERNON